

PARAFIX Bijsluiter

Toepassing

Takazumi Parafix is een diergeneesmiddel ter bestrijding van ééncellige huidparasieten en schimmels bij vijvervissen. Voorbeelden hiervan zijn: Witte stip (*Ichthyophthirius multifiliis*), Costia (*Ichthyobodo necatrix*), Chilodonella, Trichodina, Tetrahymena, Glöckertierchen (*Apiosoma*), Saprolegnia.

Samenstelling

Formaldehyde 37% - Malachietgroen oxalaat 3,7 g/L - Methyleenblauw 3,7 g/L

Contra-indicaties

Geen bekend

Bijwerkingen

Steuken en windes kunnen allergisch op dit middel reageren. Geen verdere bijwerkingen bekend. Indien u toch bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeven wij u ons en uw dierenarts daarvan op de hoogte te stellen

Doelster

Siervissen

Voorzorgsmaatregelen

Voor de behandeling actieve kool, zeoliet en dergelijke absorberende filtermaterialen uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en/of ozon apparatuur uitschakelen. Voor de behandeling 25% water verversen. Tijdens de behandeling de vijver goed beluchten. Takazumi Parafix moet in de ochtend aan de vijver worden toegevoegd. Hierdoor is eventueel afwijkend gedrag van de vissen goed waar te nemen. Blijf uw vissen tijdens en na de behandeling goed observeren.

Vissen kunnen onvoorspelbaar op diergeneesmiddelen reageren, ze kunnen bijvoorbeeld uit de vijver springen. Het is daarom raadzaam een net over de vijver te spannen tijdens de behandeling.

Dosering

Gebruik het meegeleverde maatbekertje. Roer het benodigde product in een emmer of gieter door een ruime hoeveelheid vijverwater en verdeel dit mengsel over het vijveroppervlak.
Dag 1: 15 ml/1000 liter vijverwater doseren.
Dag 2: 10-20% water verversen
Dag 3: 15 ml/1000 liter vijverwater doseren.
Dag 4: 10-20% water verversen.
Dag 5: 15 ml/1000 liter vijverwater doseren.
Dag 6: 25% water verversen.
LET OPI! DOSEER NAUWKEURIG.
Te weinig doseren werkt niet en te veel kan uw vis vergiften.
Gebruik Takazumi Parafix niet bij temperaturen onder 12°C.

Tijdens en na de behandeling

Tijdens de behandeling en de eerste dagen na afloop daarvan dagelijks de ammonium/ammoniak- en nitrietwaarden controleren. Bij verhoogde waarden direct 25% water verversen en **Takazumi Ammofix** en/of **Nitrifix** toevoegen. Gebruik Takazumi Ammofix en Nitrifix volgens de aanwijzingen op de verpakking. Wij adviseren u om na afloop van de behandeling het vijverwater gedurende 24 tot 48 uur door een filter met **Takazumi Carbon Active** te laten circuleren om geneesmiddelrestanten te verwijderen. Daarna de kool volgens voorschriften deponeren. Door toevoeging van **Takazumi Ammofix** aan het vijverwater kunt u de aangetaste micro-organismen en de biofilm helpen zich te herstellen.

Immuunsysteem

Door behandeling met een geneesmiddel of de gevolgen van een infectie zal het immuunsysteem van uw vissen nadelig worden beïnvloed. Wij adviseren daarom direct na de behandeling een volledige dosis **Takazumi Sakan-Ni Pro** aan het water toe te voegen. Dit herstelt de slijmvlies en de totale afweer van uw vissen.

Waarschuwingen en aanwijzingen

- Uitsluitend voor gebruik bij siervissen in vijvers.
- Takazumi Parafix wordt niet verdragen door steuren en windes.
- Diergeneesmiddel. Na de vervaldatum niet meer gebruiken.
- Niet samen met andere geneesmiddelen gebruiken.
- Door organisch sterk vervuurd water neemt de werking van dit geneesmiddel af.
- Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.
- De werkzame stoffen veroorzaken een verkleuring van het water die na enige tijd vanzelf verdwijnt.
- Met het verkleuren van decoratieve elementen van kunststof en van voegen met transparante silicone moet rekening gehouden worden.

- Door gemorst geneesmiddel kunnen textiel- en andere oppervlakken permanent van kleur veranderen.
- Indien u vragen heeft over de toepassing van het middel, kunt u zich tot uw dierenarts of info@takazumi.eu wenden.
- Batchnummer en vervaldatum: zie verpakking.
- Na opening van de fles is de inhoud 1 jaar te gebruiken, of tot de vervaldatum, indien deze eerder valt dan de datum van opening.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor bewaring

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Tegen licht, warmte en vorst beschermen en in de originele, goed gesloten verpakking bewaren.

Veiligheidsmaatregelen

- Niet in een afgesloten ruimte gebruiken.
- Niet inademen.
- Vermijd contact met ogen en huid.
- Bij onverhoopt contact met de ogen, deze spoelen met water tot er geen irritatie meer is.
- Ingeval van innamie direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- Draag handschoenen bij het toedienen van dit geneesmiddel.
- Draag een veiligheidsbril bij het toedienen van dit geneesmiddel.
- Draag een mondmasker bij het toedienen van dit geneesmiddel.

Voeren tijdens en na de behandeling

Vanaf het begin van de behandeling uw vissen gedurende 3 dagen niet voeren. Vanaf dag 4 beginnen met voeren van **Takazumi Yugen** ter optimalisering van het immuunsysteem. Voer Takazumi Yugen 5 dagen achtereens. Daarna gedurende minimaal 10 dagen **Takazumi Vital** voeren voor een optimaal herstel. Verder adviseren wij om **Takazumi Kien Pro** aan het water toe te voegen. Dit bevordert de spijsvertering en geeft uw vissen een vitamine boost.

Maatregelen bij overdosering; dosis overgeslagen

Na constatering van een overdosering direct 50% water verversen. Ingeval een dosis is overgeslagen, deze zo spoedig mogelijk alsnog toedienen en de behandeling vervolgens zoals beschreven voortzetten.

Filteratie gedurende de behandeling

Biologisch actieve filters, die al een tijdje niet zijn schoongemaakt, dienen voor de behandeling gespoeld te worden omdat anders het geneesmiddel gedeeltelijk gedeactiveerd kan worden. Het filter dient mee behandeld te worden, daarom het filter niet afsluiten of kortsluiten tijdens de behandeling.

Door dit geneesmiddel kunnen de bacteriën in het filter aangetast worden. Wij adviseren u dan ook om direct na de behandeling **Takazumi Ammofix** en **Nitrifix** aan het vijverwater toe te voegen. Gebruik Takazumi Ammofix en Nitrifix volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Wachttermijn

Geen. Niet geschikt voor dieren die voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn.

Verpakkingen

0,5 L - 1,0 L - 2,5 L
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale en lokale vereisten te worden verwijderd. Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.

Autorisatienummer 2115-FG.

Takazumi BV - Hellendoornseweg 62
8106 PL Mariënheem
info@takazumi.eu - www.takazumi.eu

Rev.dat. 29-03-2017

PARAFIX Packungsbeilage

Gebrauchsinformation: Informationen für den Anwender.

Pharmazeutischer Unternehmer

Takazumi BV, Hellendoornseweg 62
8106 PL Mariënheem NL
info@takazumi.eu - www.takazumi.eu
Autorisierungsnummer: 2115-FG

Bezeichnung des Arzneimittels

Takazumi Parafix. Wirkstofflösung als Zusatz zum Hältungswasser. Arzneimittel für Zierfische

Zusammensetzung

Formaldehyd 37% - Malachitgrün Oxalat 3,7 g/L - Methylenblau 3,7 g/L

Anwendungsgebiete

Takazumi Parafix ist ein Arzneimittel für Tiere zur Bekämpfung von einzelnen Hautparasiten und Schimmel bei Teichfischen. Beispiele hierfür sind: weiße Pünktchen (*Ichthyophthirius multifiliis*), Costia (*Ichthyobodo necatrix*), Chilodonella, Trichodina, Tetrahymena, Glockentierchen (*Apiosoma*), Saprolegnia.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Nebenwirkungen

Stören und Orfen können allergisch auf dieses Mittel reagieren. Es sind keine weiteren Nebenwirkungen bekannt. Sollten Sie dennoch Nebenwirkungen an Ihren Fischen feststellen, kontaktieren Sie bitte uns oder Ihren Tierarzt.

Zielfierart(en)

Zierfische

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Vor der Behandlung bitte einen Wasserwechsel von 25% vornehmen. Während der Behandlung den Teich gut belüften. Takazumi Parafix sollte morgens dem Teichwasser zugefügt werden. Hierdurch kann man ein eventuell abweichendes Verhalten der Fische besser wahrnehmen. Beobachten Sie Ihren Fisch während und nach der Behandlung stets gründlich.

Fische können völlig unerwartet auf Tierarzneimittel reagieren, sie können zum Beispiel aus dem Teich springen. Es ist daher ratsam, während der Behandlung ein Netz über den Teich zu strecken.

Wechselwirkungen mit Arzneimittel oder andere Mittel

- Nicht in Kombination mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Vor der Behandlung eventuell vorhandene Aktivkohle, Zeolith o.ä. absorbierende Filtermaterialien aus dem Filterkreislauf entfernen, UV-C-Geräte und/oder Ozon-Geräte ausschalten.
- Biologisch aktive Filter, welche bereits länger nicht mehr gesäubert wurden, sollten vor der Behandlung gereinigt werden, da ansonsten das Arzneimittel teilweise deaktiviert werden kann.
- Durch organisch stark verschmutztes Wasser nimmt die Wirkung von diesem Arzneimittel ab.
- Bei der Verwendung von Wasserbehandlungsmitteln nimmt die Wirkung von diesem Arzneimittel ab.

Dosierungsanleitung, Art und Weise der Anwendung

Benutzen Sie den mitgelieferten Messbecher. Mischen Sie die benötigte Menge vom Produkt in einem Eimer oder einer Gießkanne mit ausreichend Teichwasser und verteilen Sie dieses dann über die gesamte Teichoberfläche. Das Arzneimittel sollte bevorzugt auch mit durch den Filter laufen, deshalb sollte den Filter während der Behandlung nicht abgeschlossen oder kurzgeschlossen werden.

Dosierung

- Tag 1: 15 ml/1000 Liter Teichwasser dosieren.
- Tag 2: 10-20% Wasserwechsel vornehmen.
- Tag 3: 15 ml/1000 Liter Teichwasser dosieren.
- Tag 4: 10-20% Wasserwechsel vornehmen.
- Tag 5: 15 ml/1000 Liter Teichwasser dosieren.
- Tag 6: 25% Wasserwechsel vornehmen.

ACHTUNG! Dosieren Sie genau. Eine Unterdosierung zeigt keine Wirkung und eine höhere Dosierung zeigt keine bessere Wirkung sondern kann Ihre Fische vergiften.

Verwenden Sie Takazumi Parafix nicht bei Temperaturen unter 12°C. Während der Behandlung und die ersten Tagen nach Beendigung bitte täglich den Ammonium-/ Ammoniakwert sowie den Nitrit Wert im Wasser kontrollieren. Bei erhöhten Werten sofort einen Wasserwechsel von 25% vornehmen und Takazumi Ammofix und/oder Takazumi Nitrifix zufügen. Verwenden Sie Takazumi Ammofix und Nitrifix nach Packungsanweisung. Wir empfehlen Ihnen nach dem Ablauf der Behandlung Ihr Teichwasser für 24 bis 48 Stunden mit Takazumi Carbon Active in Ihrem Filter zu filtern um eventuelle Restbestände vom Arzneimittel für Tiere zu entfernen. Danach die Kohle gemäß den Vorschriften entsorgen. Durch die Zufügung von Takazumi

Ammofix und Nitrifix in das Teichwasser können von dieses Produkt angeschlagene Mikroorganismen und der Biofilm sich schneller erholen bzw. neu aufbauen.

Immunsystem

Durch die Behandlung mit einem Arzneimittel und die Folgen der Infektion wird das Immunsystem Ihrer Fische negativ beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen daher direkt nach der Behandlung eine volle Dosis vom Takazumi Sakan-ni Pro Ihrem Wasser zuzufügen. Es wirkt positiv auf die Schleimhaut und die Abwehrkräfte Ihrer Fische.

Füttern während und nach der Behandlung

Vom 1. Tag der Behandlung an bitte Ihre Fische 3 Tage lang nicht füttern. Ab dem 4. Tag die Fische mit Takazumi Yugen füttern zur Optimierung vom Immunsystem. Füttern Sie Takazumi Yugen 5 Tage in Folge. Danach empfehlen wir minimal 10 Tage das Takazumi Vital zu füttern für eine gute Genesung. Außerdem empfehlen wir Ihnen Takazumi Kien Pro dem Wasser zuzufügen. Dieses fördert die Verdauung und gibt Ihren Fischen einen Vitaminschub.

Hinweise für den Fall der Überdosierung; Dosierung vergessen

Nach dem Feststellen einer Überdosierung bitte sofort 50% vom Wasser wechseln. Sollten Sie eine Dosierung vergessen haben, diese trotzdem so schnell wie möglich noch dem Wasser zufügen und dann die Behandlung wie beschrieben weiter führen.

Wartezeit

Entfällt. Nicht geeignet für Tiere, welche für die Produktion von Lebensmittel bestimmt sind.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Schützen vor Licht, Wärme und Frost und in der originalen, gut verschlossenen Verpackung aufbewahren.

Besondere Warnhinweise

- Ausschließlich zur Anwendung bei Zierfischen in Teichen.
- Takazumi Parafix nicht bei Stören und Orfen verwenden.
- Arzneimittel für Tiere. Nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- Die wirksamen Stoffe verursachen eine Färbung des Wassers, welche nach einiger Zeit wieder verschwindet.
- Es kann eine Färbung von dekorativen Elementen aus Kunststoff und von Fugen aus transparentem Silikon stattfinden.
- Direkter Kontakt mit dem Produkt auf Textilien und anderen Oberflächen kann zu permanenten Färbungen führen.
- Bei Fragen zur Anwendung von diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihrem Tierarzt oder an info@takazumi.eu.
- Chargennummer und Ablaufdatum: siehe Verpackung!
- Nach dem Öffnen der Flasche kann das Produkt noch bis zu einem Jahr, bzw. maximal bis zum Ablaufdatum, verwendet werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

- Nicht in geschlossenen Räumen verwenden.
- Nicht einatmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut.
- Beim Kontakt mit Augen, diese solange mit Wasser spülen, bis es keine Irritation mehr gibt.
- Beim Verschlucken bitte sofort einen Arzt aufsuchen und die Verpackung samt Etikett vorzeigen.
- Tragen Sie Schutz-Handschuhe während der Anwendung von diesem Arzneimittel.
- Tragen Sie eine Schutzbrille während der Anwendung von diesem Arzneimittel.
- Tragen Sie einen Mundschutz bei der Anwendung von diesem Arzneimittel

Verpackungsgrößen

0,5 L – 1,0 L – 2,5 L. Es kann sein, dass nicht alle Größen in Umlauf gebracht werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendeten Arzneimitteln

Nicht verwendete Arzneimittel oder eventuellen Resten davon müssen gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Nationalen und Lokalen Bestimmungen entsorgt werden. Arzneimittel dürfen nicht über das Abwasser oder dem Hausmüll entsorgt werden.

Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage: 25-04-2017

